EndoColono
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM-MG 24432
COLOPROCTOLOGIA - COLONOSCOPIA

NOME:_____.

Dia da ligadura elástica: _____/_____/_____; _____. Horário: _____.

ENDO-COLONO ESPECIALIDADES MÉDICAS. Av. dos Andradas, 3323 – 8º andar. Santa Efigênia. Belo Horizonte. MG. Tel.: (31) 2510-3311 / 2510-3355.

Preparo para a realização da ligadura elástica das hemorroidas.

1. Minilax-------2 bisnagas.
   Aplique as duas bisnagas 2 horas antes do horário da ligadura elástica.
   Compre na farmácia e veja na bula como aplicar.
2. Tome 2 comprimidos de Buscopan Composto e 1 comprimido de Beserol 1 hora antes da ligadura elástica.

Prescrição a ser usada depois da realização da ligadura elástica.

USO ORAL

1. Beserol----------12 comprimidos.
   Tomar 1 comprimido de 12/12 hs nos primeiros 3 dias e continue no caso de dor.
2. Buscopan Composto----------10 comprimidos.
   Tomar 1 a 2 comprimidos até de 6/6 hs apenas no caso a dor.
3. FiberNorm ---2 caixas com 10 Saches de 5g
   Adicione um envelope em 200 ml de água ou, se preferir, em outro líquido ou alimento quente ou frio. Mexa até a completa dissolução. Tome duas vezes/dia.

USO LOCAL

1. Diltiazen 2% + Lidocaína 2% -- 45 g base creme antisséptico. (MANIPULADO).
   Aplique a quantidade referente a uma ervilha, um pouco dentro e o restante fora com movimentos circulares, três vezes ao dia, durante 10 a 15 dias.
2. Banhos de assento em água morna, 2 vezes ao dia, durante 10 a 15 minutos.

- A água deve ser de morna para quente (40 graus), cuidado para não se queimar.
- Coloque apenas a quantidade de água suficiente para cobrir a região perineal.
- Seque muito bem a região com uma toalha macia ou secador de cabelo.
- Você pode usar as banheiras de bebês ou os kits de banho de assento.
- Coloque 2 sachês de chá de camomila no banho de assento noturno.

Veja detalhes em https://www.drderival.com/banho-de-assento-em-agua-morna

Dr. Derival Nelmo A. dos Santos
CRM MG 24432
CONTROLE 7481706

E-mail: derival.santos@gmail.com / Site: www.drderival.com / Insta: drderivalafonso 31-99217-3218
RT: Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM/MG: 24432
Av. dos Andradas, 3323/813 (esq. com Av. do Contorno), Santa Tereza
BH | MG | CEP 31010-560 | Tel.: 2510-3311 / 2510-3355 / 98299 1128

EndoColono
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM-MG 24432
COLOPROCTOLOGIA - COLONOSCOPIA

Ligadura Elástica das Hemorroidas



1. A ligadura elástica é uma ótima opção de tratamento para hemorroidas sintomáticas de grau I-II e alguns casos de grau III que não respondem ao tratamento clínico.
2. Na posição genupeitoral o anuscópio é retirado lentamente para identificar a maior hemorroida. O ligador de sucção com o elástico é colocado no ápice da hemorroida. A hemorroida é aspirada para dentro do cilindro e se o paciente não sente dor o elástico é disparado. Esse elástico corta o suprimento de sangue causando a necrose e posterior eliminação em 1 a 2 semanas juntamente com elástico deixando uma úlcera. A cicatrização da úlcera causa fibrose reduzindo ou eliminando o prolapso que possa estar presente.
3. São realizadas 2-3 ligaduras por vez (cada ligadura corresponde a uma sessão, portanto em cada aplicação realizam-se 2-3 sessões), sendo necessária 1 a 2 aplicações com intervalo de 3-4 semanas.

O que você pode apresentar após a ligadura elástica das hemorroidas:
A resposta e tolerância ao procedimento são individuais, enquanto umas pessoas voltam a atividades regulares quase imediatamente outras podem necessitar de 1 a 2 dias de repouso.
Reflexo Vagal: alguns pacientes, imediatamente após as ligaduras, apresentam tontura com sudorese fria e palidez. Isso é causado por uma queda repentina e temporária da frequência cardíaca (síncope vasovagal). Efeito fugaz, melhorando em poucos minutos com o repouso.
Dor anal: geralmente descrito como um desconforto ou sensação de um "corpo estranho" ou vontade para evacuar e pode durar 24 a 36 horas, mas melhora com uso dos analgésicos prescritos. Dor severa é incomum e precisa ser comunicada por estar associado à infecção.
Sangramento Anal: ocorre em 2 a 15 dias, geralmente discreto e junto às evacuações. São raros os sangramentos intensos que necessitam de hospitalização e cirurgia para a resolução.
Infecção Local: complicação rara e caracterizada pela febre, dor anal intensa, latejante e contínua; geralmente acompanhada da dificuldade para urinar, mas na sua maioria, responde rapidamente ao uso de antibióticos e raramente evolui.
Retorno dos Sintomas das Hemorróidas: deve-se ao aparecimento de novas hemorróidas, as quais são, na sua maioria, facilmente religadas.

Dr. Derival Nelmo A. dos Santos
CRM MG 24432
CONTROLE 7481706

E-mail: derival.santos@gmail.com / Site: www.drderival.com / Insta: drderivalafonso 31-99217-3218
RT: Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM/MG: 24432
Av. dos Andradas, 3323/813 (esq. com Av. do Contorno), Santa Tereza
BH | MG | CEP 31010-560 | Tel.: 2510-3311 / 2510-3355 / 98299 1128